



Признаки отравления синтетическими наркотиками

- рвота;
- судороги;
- подъем артериального давления;
- учащенное сердцебиение;
- галлюцинации;
- психоз;
- отсутствие реакции на внешние раздражители;
- коматозное состояние.

**ВОЗМОЖЕН СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД
СРОЧНО ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!**



Куда обратиться, если пришла беда?

ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»

г. Томск, ул. Лебедева, 4,
т. 44-34-63 (регистратура)

Кабинет приема детей и подростков:
т. 46-74-96, 46-87-02

В областном наркологическом диспансере осуществляются все виды современной высококвалифицированной помощи.



Знаешь, где распространяют наркотики?

Телефон дежурной части
УМВД России по Томской области
(3822) 271-220

Звонки принимаются круглосуточно.




ТВОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА

СВОБОДА



Свободным тебя делают любовь к себе, ответственность за свою жизнь, умение мечтать и достигать целей.




Употребление наркотиков сделает тебя зависимым.

СЧАСТЬЕ



Счастливым тебя делают близкие люди и друзья, интересные увлечения.




Наркотики лишат тебя способности испытывать удовольствие от реальной жизни.

ЗДОРОВЬЕ



Здоровым тебя делают активный образ жизни, правильное питание и позитивный настрой.



Наркотики разрушат твой мозг, печень, почки и другие органы.




БЫТЬ СВОБОДНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ И ЗДОРОВЫМ – ТВОЙ ВЫБОР!

Издано в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

ОГБУЗ «Центр медицины



Синтетич наркотики



Синтетические наркотики

Синтетические наркотики – химически синтезированные вещества, оказывающие наркотическое действие на человеческий организм («соль для инн», спайс, экстази и т. д.)

Синтетические наркотики за короткое время могут полностью разрушить жизнь и здоровье человека.

то характерно для синтетических наркотиков?

БЫСТРЕЕ возникает зависимость

■ синтетические наркотики очень опасны, поскольку привыкание к ним возникает быстро, развивающаяся зависимость относится к категории самой тяжелой, с которой не всегда справляются даже наркологи;

БЫШЕ риск преждевременной смерти

■ нестабильность состава, отсутствие чистки и контроля качества, экспериментальный характер большинства используемых веществ – всё это способно убить потребителя



Медицинские последствия

Изменяется внешний вид

«стеклянный взгляд», красные глаза, зрачки сужены или расширены, речь ускорена или замедлена, бледность, выпадение волос, похудание. Выглядят наркоманы намного старше своего возраста.

Поражаются внутренние органы



Нервная система (особенно головной мозг): ухудшение памяти, мышления, колебания настроения, неврозы.



Иммунная система: организм хуже справляется с инфекционными заболеваниями.



Пищеварительная система: расстраивается пищеварение, что вызывает значительную потерю массы тела и резкое истощение.



Печень: воспалительные, застойные или дистрофические процессы, гепатиты.



Сердце: возрастает вероятность инфаркта



Социальные последствия

■ Человек перестает быть частью общества, что раньше было значимым, теряет смысл.

■ Попытки родителей помочь ребенку приводят к его раздражению и злобу.

■ Появляются проблемы с работой.

■ Понятия о моральных нормах становятся размытыми, что часто приводит к нарушениям закона.

■ Зависимый постепенно приспосабливается к жизни, чтобы облегчить доступ к наркотикам, его социальная активность снижается, он не знает, как взаимодействовать с обществом.



Как избежать зависимости

1. Быть абсолютно уверенным в себе, отказаться от употребления любых наркотических веществ.

Основные проявления опиоидной зависимости:

- быстро нарастающее расстройство психики и поведения (больные становятся раздражительными, агрессивными; быстро нарастает отчуждение от родных и близких, появляются лживость и скрытность)
- изменение круга общения (всегда в худшую сторону);
- расстройство питания, заметное снижение массы тела;
- расстройство сна, изменение суточных ритмов сна и бодрствования (смещенное за полночь засыпание и позднее пробуждение);
- определение наркотиков и их метаболитов в моче.

Для преодоления зависимости необходима длительная внутренняя работа самого человека при поддержке близких людей, врачей, психологов.



Реализуй свое право на ЗДОРОВЬЕ!



Дополнительная информация

Как развивается зависимость
www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/kak-razvivaetsya-zavisimost/



Физическая зависимость
www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/fizicheskaya-zavisimost/



Мы готовы Вам помочь

ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»
 г. Томск, ул. Лебедева, 4
 Главный врач - т. 26-44-49, 26-44-64
 Кабинет экспертизы опьянения - т. 26-43-77

Издано в рамках программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области (2014 – 2018 годы)»



ГЕРО

Героин-полусинтетический наркотик группы опия. Любой способ употребления приводит к зависимости, так как наркотик попадает в кровоток, единый для всего организма.

Героин быстро вызывает психическую и физическую зависимость. Психическая зависимость означает, что человек стремится добиться внутреннего равновесия с помощью героина и испытывает желание вновь испытать действие наркотика. Наркотик начинает замещать собой все обычные для человека положительные эмоции. Потребитель наркотика искренне считает, что именно он сумеет вовремя отказаться от употребления наркотика и не попадет в зависимость; «не слышит» поступающую информацию об опасности употребления наркотика.

При постоянном употреблении героина снижается чувствительность к данному веществу, что приводит к необходимости увеличить дозу наркотика. Часто употребление наркотика, как проблема, начинает осознаваться человеком, когда он попадает в

Синдром отмены («ломка») - это комплекс физических и психических нарушений, возникающих у зависимого человека при отказе от наркотика. Первые признаки абстиненции могут проявляться через 6-8 часов после приема последней дозы героина. Тягостные проявления нарастают постепенно, наблюдаются: потливость, слизистые выделения из носа, расширение зрачков, озноб или лихорадка, тремор (дрожание конечностей), желудочные колики, рвота, жидкий стул, повышение артериального давления, сердцебиение, боли и спазмы в мышцах. Появляется страх перед «ломкой». Тревога и раздражительность, агрессивность, нарастающее желание принять наркотик приводят к неконтролируемым поступкам. Ради достижения желаемого зависимый человек может прибегать к



При отказе от потребления многих зависимых людей срывы, возврат к употреблению. Отказаться от героина с зависимый человек на биохимическом уровне наркотика и решать возникшие проблемы. Одной из причин смерти от героина является передозировка, которая тормозит работу дыхательного центра, если доза превысила обычную, происходит полная остановка дыхания.

При передозировке героина человек засыпает, однако в действительности сознание, он редко и слабо сужены, сердечные сокращения реже, чем обычно, артериальное давление понижено. Человеку необходима скорая медицинская помощь.

У потребителя героина снижается чувствительность к данному веществу, что приводит к необходимости увеличить дозу наркотика. Часто употребление наркотика, как проблема, начинает осознаваться человеком, когда он попадает в

заметать никаких симптомов

